

INFORMAZIONI TAC CON MDC

Esami da effettuare per TAC con Mezzo di Contrasto:

- Azotemia;
- Creatinemia;
- Emocromo con formula;
- Glicemia;
- Proteinuria di Bence-Jones;
- Q. P. E. (Quadro Proteico Elettroforetico);
- Urine;
- E. C. G. (Elettrocardiogramma)

Stare digiuni dei ore prima dell'esame e non mangiare latticini e verdure dalla sera prima.

Durante il digiuno si può bere acqua.

Terapia desensibilizzante pre-contrastografica per pazienti con diatesi allergica

Zirtec cpr 1 per 2 volte al giorno

La terapia sopraindicata deve essere praticata nei 3 giorni precedenti all'esame contrasto grafico.

Bentelan 4mg 1 fiala la sera precedente al giorno dell'esame

Per i **diabetici** la dose è dimezzata e deve essere effettuato un controllo glicemico.

Preparazione con Fluimucil in paziente con insufficienza renale lieve

2 fiale di Fluimucil da 300 mg in soluzione fisiologica da 250 2/3 giorni prima e dopo l'esame.

In Alternativa

Preparazione da effettuarsi per i 4 giorni precedenti la data dell'esame contrasto grafico:

- Bere 2 litri di acqua al giorno;
- Assumere una compressa di fluimucil (effervescente) la sera.